

「ICU/CCU の薬の考え方, 使い方<1 版 1 刷>」正誤表 (2011 年 3 月現在)

このたびは「ICU/CCU の薬の考え方, 使い方<1 版 1 刷>」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

233 頁 図 52 図中の最下段

(誤)CRS

(正)QRS

247 頁 表 61 下から 2 行目

(誤)テルフェナジン, アステミゾール

(正)テルフェナジン, アステミゾール(現在, 国内発売中止)

293 頁 Case8 3 行目

(誤)上腸管膜動脈

(正)上腸間膜動脈

391 頁 ケース 7 行目

(誤)ICU 入室. 自発呼吸温存するため,

(正)ICU 入室. 呼吸状態悪化のため気管内挿管, 人工呼吸管理となった. 自発呼吸温存するため,

421 頁 4 行目

(誤)..., 小野あづさ, ...

(正)..., 小野あずさ, ...

「ICU/CCU の薬の考え方, 使い方<1 版 2 刷~4 刷>」正誤表 (2012 年 12 月現在)

このたびは「ICU/CCU の薬の考え方, 使い方<1 版 2 刷~4 刷>」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

44 頁 下から 5 行目, 付録 12 頁 2 行目

(誤)レペタン(R) 0.1mg/1ml

(正)レペタン(R) 0.008mg/1ml

44 頁 下から 3 行目, 付録 12 頁 4 行目

(誤)レペタン(R)(0.2mg/1ml) 2A 5mg

(正)レペタン(R)(0.2mg/1ml) 2A 0.4mg

209 頁 下から 4 行目, 付録 22 頁 7 行目

(誤)(体重×0.1ml/hr: 1~2μg/kg/分, 50kg のとき)

(正)(1~2μg/kg/分: 50kg のとき)

「ICU/CCUの薬の考え方、使い方<1版5刷>」正誤表 (2012年12月現在)

このたびは「ICU/CCUの薬の考え方、使い方<1版5刷>」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

44頁 下から5行目, 付録12頁2行目

(誤)レペタン(R) 0.1mg/1ml

(正)レペタン(R) 0.008mg/1ml

44頁 下から3行目, 付録12頁4行目

(誤)レペタン(R)(0.2mg/1ml) 2A 5mg

(正)レペタン(R)(0.2mg/1ml) 2A 0.4mg


「ICU / CCU の薬の考え方, 使い方<1 版 6 刷>」正誤表
 (2014 年 9 月現在)

このたびは「ICU / CCU の薬の考え方, 使い方<1 版 6 刷>」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

234 頁 図 53

(誤) 図中、赤色部分が誤りとなります。



(正) 図中、青色部分のように訂正いたします。

