序

新型コロナウイルスの国内第7波がようやく落ち着きつつある。目の前のコロナの7波の対応や、今後の対策、さらに、冬を迎えるにあたりインフルエンザの脅威など医療に対する課題は山積している。医療のみならずウクライナ戦争や進む円安、元総理の国葬問題などもあり、なかなか大変な令和の世の中であるが、忘れてはならないのが、このサル痘だ。

感染力の問題から、おそらく新型コロナウイルスのような事態にまでなる可能性は低いだろうが、水面下で依然として感染は拡大している。本文中でもするように、性感染症としての特徴も持つ本感染症は、このように水面下にゆっくりと持続的な流行が続く可能性がある。

おそらく、じきに様々な医療機関で患者が報告されてくると考えて、準備していた方がよい。本書はそのために院内の職員対象に行った講義を書き下ろしたものである。加えて、性感染症の診療の基本を理解して頂くための講義も収録した。

新型コロナウイルスにおいても、デマや差別偏見といったウイルス以外の戦いが現場の負担となったことは忘れられない。サル痘においては、新型コロナウイルス以上に差別や偏見の目にさらされることにWHOは警鐘を鳴らし、病名自体の変更も検討されている。

差別や偏見の一部は、不正確な知識からしばしば生まれてくる。流行が拡大してしまう前に、多くの医療従事者の皆様に、わかりやすさを第一に心がけた本講義録を一読いただいて、差別偏見なく、本来はどこでも診療できるはずである本4類感染症の診療の参考になれば幸いである。

2022年10月

岡 秀昭

- ✓ **1950年代**
アカゲザルから発見されたウイルス
- ✓ **1970年**
ヒトへの感染がコンゴで確認
- ✓ 元々は、西アフリカの風土病
- ✓ 日本では4類感染症

図1 サル痘 (monkey pox)

であることから、monkey pox という名前がつけられました。サルに感染症を起こしたウイルスであったため、当初はサルからヒトへの感染や、ヒトからヒトへの感染が起こるかどうかはわかっていませんでした。ところが、1970年にヒトへの感染が西アフリカのコンゴ（発見当時の国名はザイール）で確認され、サル痘はサルだけではなく、人畜共通つまり人間と家畜・動物の両方が感染するウイルスであることがわかりました。

その後しばらくのあいだ、西アフリカや中央アフリカあたりでエピソードとして局所的に患者が発生し、小さな流行を起こす、この地域特有の風土病という状態が続いていました。

サル痘のウイルスの起源は大きく分けると2つあります。1つはコンゴなど中央アフリカを由来とするもの [コンゴ盆地型 (クレード1)], もう1つはナイジェリアやコートジボワールなど西アフリカを由来と

天然痘ワクチンの中止以降、
サル痘の流行が警戒されていた。

再興感染症！

- ✓LC16m8ワクチンは高い発症予防効果が示されている
(Saijo M, 2006, Iizuka I, 2017, Gordon SN, 2011).
- ✓LC16m8ワクチンを含む痘そうワクチンの使用を推奨している
(WHO, 2022c).
- ✓LC16m8ワクチンの安全性については、昭和49年度に約5万人の
小児に接種され、重篤な副反応は報告されなかった

図 14 天然痘ワクチン

天然痘の予防という話も WHO より言及されていますが、サル痘予防以外にも、現在において天然痘ワクチンを打つ必要がある場合が実際にあります。バイオテロ対策として軍人には接種が必要になる場合がありますし、ウイルス研究のために実験をする研究者も接種の必要があります。こうした目的のために、天然痘ワクチンはウイルスの撲滅宣言後も製造・備蓄されています。日本では天然痘のワクチン接種は、天然痘が根絶されもはや接種の必要がないという判断に基づき、昭和50年(1975年)で終わりになっています。

この LC16m8 ワクチンの安全性ですが、まだ接種が義務であった昭和49年度(1974年)に約5万人の小児に接種され、重篤な副反応はなかったと報告されています。また詳細に臨床症状を観察し得た10,578例での発熱率は7.7%であり、その他の副反応もいずれも軽症だったとのこと¹³⁾。また、サル痘ウイルス曝露後4日以内に天然痘ワクチンを接種すると感染予防効果があり、曝露後4~14日で接種した場合は重症化予防効果があるとされています¹⁴⁾。[*8月2日付で、

症例1 50代 男性

主訴 食欲低下，体重減少

現病歴

入院5ヵ月前から食欲不振あり，体重が3ヵ月で12kg減少．入院3週間前より水様便が持続し，同時期から労作時呼吸困難を認めていた．近医より悪性腫瘍を疑われ紹介．

既往歴

3年前に**B型急性肝炎**，**梅毒**

身体所見

口腔内白苔あり．

図 26 症例1 50代男性

ど，何か悪性腫瘍があるのではないかとということが考えられるため，近医から当院に紹介がありました。

この患者で一番重要なことは，問診の際にわかったのですが，3年前にB型急性肝炎と梅毒の既往があることです．身体所見としては，痩せてはいるもののリンパ節腫脹やがんを疑うようなしこりはありません．口を開けてもらうと，真っ白に白苔がついていました．もうおわかりかと思いますが，口腔内から食道にかけてカンジダ症になっていました．糖尿病や悪性腫瘍の進行，抗生物質の使用など様々な影響で口腔内にカンジダ症は起こりうるのですが，この方の場合には著しい体重減少を起こす消耗性の疾患が背景にあると考えます．年齢的に悪性腫瘍も鑑別には拵がりますが，抗がん剤もやっていない状況ですでに白苔が生じています．

さらに，この所見をみる前に，B型肝炎と梅毒の既往があるという時点で私たち感染症専門医はピンと来て，頭のなかにはほぼ答えが浮かん

図 30 胸部単純X線写真 (day 12)

図 31 治療経過

-
- ✓梅毒
 - ✓性器クラミジア
 - ✓淋菌感染症
 - ✓性器ヘルペス
 - ✓尖圭コンジローマ
 - ✓膣トリコモナス
 - ✓HIV

図 41 性感染症とは？

-
- ✓A・E型肝炎
 - ✓B・C型肝炎
 - ✓赤痢アメーバ
 - ✓ジカウイルス感染症
 - ✓エボラウイルス
 - ✓サル痘

図 42 意外な性感染症

図 56 梅毒 病期は？ 検査予想は？

(佐藤貴浩. 見てわかる皮膚疾患 診察室におきたいアトラス. 川田暁 他, 中外医学社. 2019. P164 より)³⁰⁾

うらせん状の菌が性的接触を介して粘膜に感染し、まず陰部、口腔内に菌の入った下疳（潰瘍）をつくります。この時の潰瘍には基本的に痛みはありません。したがって、図 56 のような潰瘍をみた時に、痛みがないのであればヘルペスよりも梅毒を疑います。サル痘も鑑別には入りませんが、基本的に渡航歴や明らかな接触歴がなければ、まず梅毒を疑いましょう。

ここで梅毒検査を行うのですが、われわれが覚えておかなければいけないのは、この段階で検査をしても必ずしも陽性にはならないということです。この図では第 1 期に当たります。初期には検査結果が陰性になったり、2 種類の検査結果が乖離したりします。教科書的には、この潰瘍をこすったものを暗視野顕微鏡で観察するとスピロヘータが確認できるとされていますが、そんな検査ができる医療機関はほとんどないのではないかと思います。つまり、第 1 期梅毒に対しては臨床診断するしかないのです。痛みがない潰瘍で、病歴的にリスクがあれば梅毒だろう